

WEICAP. Línea verde



ABONO ÓRGANO-MINERAL LÍQUIDO. PFC 1 (B)(II)

Abono N (Ca) 9.4 (4.1) con carbono orgánico

Composición	
Nitrógeno (N) total	9.4% p/p
Nitrógeno (N) orgánico	1.8 % p/p
Nitrógeno (N) nítrico	4.9% p/p
Nitrógeno (N) amoniacal	2.7% p/p
Óxido de Calcio (CaO) soluble en agua	4.1% p/p
Carbono (C) orgánico	22% p/p
Materia seca	42%

Instrucciones de uso

Aplicación foliar: utilizar el volumen de caldo necesario para una correcta distribución y recubrimiento del cultivo, para formar una película uniforme y homogénea. Se realizará una única aplicación por ciclo.

- Melocotonero, nectarino, paraguayo, cerezo: 10-12 L/100 L (100-120 L/ha) con un consumo aproximado de caldo de 1000-1200 L/ha

- Uva de mesa: 10-15 L/100 L (80 L/ha) con un consumo aproximado de caldo de 500-700 L/ha

- Frambueso: 10-15 L/100 L (100-120 L/ha) con un consumo aproximado de caldo de 800-1000 L/ha

Momento de aplicación: La aplicación debe realizarse cuando el cultivo tiene un mínimo de 70% de horas frío y cumple además los días antes del inicio de brotación especificados a continuación (considerándose inicio de brotación en paraguayo, melocotonero, nectarino y cerezo sobre 3-5% de flores abiertas).

- Paraguayo: aproximadamente 45 días antes de inicio de brotación.

- Melocotonero: aproximadamente 40 días antes de inicio de brotación.

- Nectarino: aproximadamente 35 días antes de inicio de brotación.

- Cerezo: aproximadamente 35-45 días antes de inicio de brotación.

- Uva de mesa: aproximadamente 35-40 días antes de inicio de brotación.

- Frambueso: aproximadamente 30 días antes de inicio de brotación.

En caso de no cumplirse las indicaciones anteriores se puede provocar algún daño y alterar la eficacia del producto.

Se recomienda seguir el programa de dormancia para conseguir los mejores resultados, con tratamientos en inducción floral y post-cosecha.

Uso profesional.

Póngase en contacto con la empresa para obtener recomendaciones más específicas. Estas dosis de aplicación del producto son recomendaciones. Se recomienda a los agricultores que pidan consejo a su asesor para ajustar las recomendaciones a su situación particular y evitar el exceso de fertilización.

Otra información / Información adicional

Formulación exclusiva basada en la aportación nitrógeno, calcio, lípidos, glicolípidos, oligo y polisacáridos. Capaz de actuar en la central reguladora de ciertos cultivos y así conseguir anticipar, sincronizar y homogenizar el despertar de la dormancia. De esta forma se consigue incrementar la precocidad, cantidad y calidad de las cosechas.

No aplicar en cultivos arbóreos de menos de 4 años. Aplicar solo, sin mezclas. No utilizar con otros productos de interrupción de dormancia en el mismo ciclo anual. No utilizar durante la fase vegetativa. No sobrepasar las dosis indicadas. Aplicaciones en plantas débiles nutricionalmente, clorosis, así como saltos térmicos elevados u otras razones pueden producir riesgo de fitotoxicidad y/o disminuir la eficacia del producto. No aplicar compuestos de azufre tradicionales, cobres, aceites de cualquier tipo ni polisulfuro en los 15 días anteriores o posteriores a la aplicación de WEICAP.

Contiene urea, que puede liberar amoníaco y tener repercusiones en la calidad del aire. Dependiendo de las condiciones locales, se deben tomar las medidas correctoras apropiadas.

Líquido en solución; Densidad = 1.22 kg/L; pH (1% m/v, 20°C) = 5.9 ± 0.5 ; exento de cloruros; bajo contenido de cadmio.

Ingredientes adicionales: polisacáridos, oligosacáridos, glicéridos C16-C18

El producto produce espuma al diluirse, en función de la dureza del agua; añadir un agente antiespumante en caso necesario.

Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, meteorología, etc.). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Cuando existan situaciones de riesgo de fitotoxicidad, realizar previamente un ensayo a pequeña escala para evitar daños irreversibles al cultivo.

Mitigación de riesgos medioambientales y Plazo de seguridad: no procede.

Condiciones de almacenamiento recomendadas

Almacenar en su recipiente original, bien cerrado, en lugar fresco (entre 10 y 35°C), seco y bien ventilado, fuera del alcance de la luz solar directa.

Ingredientes

nitrato amonio (CAS 6484-52-2)¹, nitrocalcita (CAS 15245-12-2)¹, sacarosa (CAS 57-50-1)¹

¹CMC1: Sustancias y mezclas de materiales vírgenes

Información sobre seguridad y medio ambiente

H318 Provoca lesiones oculares graves;

P280 Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección;

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando; P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO de información toxicológica o a un médico; P391 Recoger el vertido; P501 Eliminar el recipiente en un punto de recogida especial conforme a la reglamentación local, regional, nacional y/o internacional. A fin de evitar riesgos para las personas y el medio ambiente, siga las instrucciones de uso recomendadas de este producto fertilizante.



Peligro